

● 性フェロモンで対象害虫の交尾を阻害することで発生を抑制

● 有機JASに使用できます

交信かく乱用性フェロモン剤

# スカシバコン® L

シナンセルア剤



交信かく乱用  
性フェロモン剤  
の詳しい説明は  
WEBで



交信かく乱用性フェロモン剤

# スカシバコン<sup>®</sup>L



有効成分	(E,Z)-オクタデカ-2,13-ジエニル=アセトート.....3.5% (E,Z)-オクタデカ-3,13-ジエニル=アセトート.....42.9% (Z,Z)-オクタデカ-3,13-ジエニル=アセトート.....40.9% 安定剤等.....12.7%
安全性	人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう通称） 魚毒性：この登録に係る使用方法では該当がない
包装形態	50本/袋、100袋/箱

## 特長

- 1 性フェロモン剤の有効成分は微生物等により容易に分解されるため、環境にやさしい防除剤です。
- 2 性フェロモン剤は、殺虫剤と比べても一般的に抵抗性がつきにくいとされています。
- 3 作物への残留も心配なく、輸出用作物にも使用できます。
- 4 効果が長期間持続します。

## 上手な使い方

### 処理量

通常の場合、本剤は10a当り50本とし、圃場の立地条件（傾斜）、周囲の状況や風向き等を考慮に入れて、8割程度を圃場全体にほぼ均等に設置してください。残りの2割程度を圃場内周辺に処理すると効果的です。

### 処理位置

目通りの高さ（約150cm程度）になるべく圃場全体が均等になるように取り付けてください。但し、樹高が不均一の場合はなるべく高い位置に設置してください。


### 取り付け方法

枝に軽くひとひねりして固定してください。

### 設置面積

設置面積は3ha以上のまとまった圃場でおこなうと効果的です。3ha以下の設置面積の場合は圃場内周辺に多く設置するなど留意してください。

枝にかけて、ひとひねりすれば取り付け完了。



## スカシバコンLの登録内容

作物名	使用目的	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用方法
果樹類 食用さくら(葉) さくら	交尾阻害	コスカシバ	40~100本/10a (8g/100本製剤)	成虫発生 初期から終期	ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け設置する。
かき		ヒメコスカシバ			
キウイフルーツ		キクビスカシバ	100本/10a (8g/100本製剤)		

### 使用上の注意事項

- 本剤は、果樹類、食用さくら(葉)、さくらのコスカシバ、かきのヒメコスカシバ及びキウイフルーツのキクビスカシバの各成虫の交尾を連続的に阻害し、交尾率を低下させることによる次世代の密度低下を目的としていますので、これらの成虫発生初期から、比較的広範囲な地域で使用することが望ましいです。
- 対象害虫が高密度に存在する場合には状況に応じて天敵に影響の少ない殺虫剤を併用することが望ましいです。
- 本剤は樹木等に巻き付け、対象地帯に均一になるように設置してください。また、標準的な使用量は10アール当たり果樹類、食用さくら(葉)、さくらのコスカシバ、かきのヒメコスカシバ：40~100本、キウイフルーツのキクビスカシバ：100本ですが、立地条件や風向、傾斜等により効果が振れる場合がありますので、諸条件から判断して、必要な場合は使用量の範囲内で、特に周辺部に多めに設置することが望ましいです。
- 急傾斜地、風の強い地域等本剤の濃度を維持するのが困難な地域では使用しないでください。
- 製剤を直接ふれた手で収穫物を触ると臭いが移るおそれがありますので手を洗ってください。
- 外装のアルミ箔袋を開封したまま放置すると有効成分が揮散しますので、必ず使用直前に開封し、使い切ってください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

### 安全使用上の注意事項

- 本剤は皮膚に対して刺激性がありますので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。

### 保管上の注意事項

- 火気をさげ、直射日光が当たらない冷暗所(5℃以下)に密封して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。 ○ラベルの記載以外には使用しないでください。 ○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2021年9月現在の知見に基づいて作成されています。